



Jei atliekami jūsų kūdikio šlapimo tyrimai, jų rezultatus gausite per dvi savaites. Sutikdami duoti savo kūdikio šlapimo mėginį taip pat sutinkate su tuo, kad mėginys bus iširtas. Taip pat duodate sutikimą, kad tyrimo rezultatais būtų pasidalinta su Nacionaliniu vaikų infekcinių ligų centru, „Rainbow“ klinika ir CHI, esančiu Crumlin and Temple gatvėse. Šios įstaigos susisieks su jumis ir praneš rezultatus.

Svarbu.

Jei negaunate atsakymų per dvi savaites,

turite susisiekti su:

🌸 Ligoninės, kurioje gimdėte, skyriumi arba palata. Kontaktiniai duomenys nurodyti šio lankstinuko pirmajame puslapyje.


Arba

🌸 Nacionaliniu vaikų infekcinių ligų centru, „Rainbow“ klinika ir CHI, esančiu Crumlin gatvėje, telefono numeriu

01-409 6338

Įgimta citomegalo viruso infekcija (cCMV)

Informacija tėvams ir teisiniams globėjams



Palatos pavadinimas:

Palatos telefono numeris:

Jei turite klausimų, pasikalbėkite su personalu.

Kas yra įgimta citomegalo viruso infekcija (cCMV)?

CMV yra dažnai sutinkamas virusas. Sveikiems vaikams ar suaugusiems CMV įprastai nesukelia jokių simptomų. Tačiau jei CMV užsikrečia negimę vaikai, jiems gali pasireikšti sveikatos sutrikimai. Įgimta citomegalo viruso infekcija reiškia, kad kūdikis gimsta sirgdamas CMV.

Kaip plinta CMV?

Asmenys užsikrečia CMV per sąlytį su kūno skysčiais. Jei susergate CMV būdama nėščia, infekcija gali būti perduota jūsų kūdikiui. Tai vadinama įgimta CMV infekcija.

Kokie yra infekcijos simptomai?

Didžiajai daliai cCMV infekcija sergančių kūdikių gimimo metu nepasireiškia jokie simptomai. Tačiau kai kuriems kūdikiams gali pasireikšti komplikacijos, įskaitant klausos praradimą.

Įgimtos CMV infekcijos sukeltas klausos praradimas gali būti lengvos arba sunkios formos. Po gimimo jis gali pasunkėti.

Jei jūsų kūdikiui pasireiškė klausos praradimas, jis gali paveikti vieną arba abi ausis.

Koks gydymas yra taikomas?

Infekcija gydoma priešvirusiniais vaistais. Jei nusprendžiama, kad jūsų kūdikiui būtų naudingas gydymas, geriausiu atveju jis turi būti pradedamas prieš kūdikiui sulaukiant 4 savaičių. Ankstyvas gydymas suteikia jūsų kūdikiui geriausią tikimybę gauti ilgalaikę naudą.

Nuskenaukite šį QR kodą, jei norite gauti daugiau informacijos apie CMV nėštumo metu.



Kaip diagnozuojama cCMV infekcija?

- 1 Atlikęs naujagimio klausos tyrimą specialistas siunčia jūsų kūdikį į Audiologijos skyrių, kur bus atliekamas jo klausos vertinimas. Jūsų kūdikiui taip pat bus siūloma atlikti cCMV tyrimą. Tai yra šlapimo tyrimas.
- 2 Gavus jūsų sutikimą kūdikio šlapimas bus ištiriamas per pirmąsias 3 savaites po gimimo. Tai atliekame tam, kad patikrintume, ar kūdikis neserga cCMV infekcija. Šlapimo mėginys įprastai paimamas iš pilnų sauskelnių. Tai atliekama naudojant vatos gumulėlį ar kitu būdu. Jums bus pranešta apie šlapimo mėginio paėmimo būdą.
- 3 Įsitinkite, kad šlapimo mėginį imantis (-i) slaugytojas (-a) turi teisingą jūsų telefono numerį ir adresą.

Neigiamas šlapimo tyrimo atsakymas

Neigiamas tyrimo atsakymas reiškia, kad jūsų kūdikis neserga cCMV. Apie tokį atsakymą jums bus pranešta laišku.

Atminkite. Vis vien svarbu, kad jūsų kūdikis atvyktų tolesniems vizitams į Audiologijos skyrių.

Teigiamas šlapimo tyrimo atsakymas

Teigiamas šlapimo tyrimo atsakymas reiškia, kad jūsų kūdikis serga įgimta CMV infekcija. Toliau turėtumėte imtis šių veiksmų:

- 1 „Rainbow“ klinikos vaikų infekcinių ligų komanda iš CHI Crumlin ir Temple gatvėse susisieks su jumis ir susitars dėl susitikimo ambulatoriškai.
- 2 Komanda atliks jūsų kūdikio tyrimus. Jie nuspręs, ar jūsų kūdikiui būtų naudingas gydymas.
- 3 Prašome jūsų ir toliau su kūdikiu atvykti į visus kitus klausos tyrimus bei įprastus vizitus pas šeimos gydytoją. Taip pat svarbu, kad jūsų kūdikis atvyktų į visus vizitus pas visuomenės sveikatos slaugytoją. Tai galioja ir visoms kūdikių vakcinoms.