



Ważne

Jeśli zbadany zostanie mocz Twojego dziecka, wynik otrzymasz w ciągu dwóch tygodni. Wyrażając zgodę na oddanie próbki moczu dziecka, wyrażasz zgodę na jej przebadanie. Wyrażasz także zgodę na udostępnienie wyniku zespołowi specjalistów Krajowego Centrum Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Rainbow Clinic, CHI w Crumlin i Temple Street. Skontaktują się oni z Tobą w sprawie wyników.

Ważne:

Jeśli nie otrzymasz wyników w ciągu dwóch tygodni,

skontaktuj się z jedną z niżej wymienionych placówek:


- ❁ Oddział lub pododdział szpitala, w którym rodziłaś. Dane kontaktowe znajdują się na okładce niniejszej ulotki.

lub

- ❁ Krajowe Centrum Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Rainbow Clinic, CHI w Crumlin pod numerem: 01-409 6338

Wrodzony wirus cytomegalii (cCMV)

Informacje dla rodziców i opiekunów prawnych



Nazwa oddziału:

.....

Numer telefonu oddziału:

.....

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania, porozmawiaj z personelem medycznym.

Co to jest wrodzony wirus cytomegalii (cCMV)?

(Cytomegalia, w skrócie CMV)

CMV jest powszechnym wirusem. U zdrowych dzieci i dorosłych CMV zwykle nie powoduje żadnych objawów. Natomiast u nienarodzonych dzieci mogą wystąpić problemy zdrowotne, jeśli dojdzie do zakażenia CMV. Cytomegalia wrodzona (cCMV) oznacza, że dziecko rodzi się z zakażeniem wirusem CMV.

Jak rozprzestrzenia się CMV?

CMV przenosi się z jednej osoby na drugą poprzez kontakt z płynami ustrojowymi. Jeśli jesteś w ciąży i zarazisz się wirusem CMV, infekcja może zostać przekazana dziecku. Nazywa się to wtedy wrodzoną infekcją CMV.

Jakie są objawy?

Większość dzieci z cytomegalią wrodzoną (cCMV) po urodzeniu nie ma żadnych objawów. U niektórych występują jednak powikłania. Jednym z nich jest niedosłuch.

Ubytek słuchu spowodowany wrodzoną cytomegalią może być łagodny lub ciężki. Zdarza się niekiedy, że po urodzeniu się pogarsza.

Jeśli Twoje dziecko ma niedosłuch, może on dotyczyć jednego lub obojga uszu.

Jakie leczenie się stosuje?

Leczenie polega na podaniu leku przeciwwirusowego. Jeśli zostanie podjęta decyzja, że leczenie przyniesie korzyść, najlepiej rozpocząć je przed ukończeniem przez dziecko 4 tygodnia życia. Wczesne podjęcie leczenia dziecka daje największe szanse na długotrwałe korzyści.

Zeskanuj kod QR,
aby uzyskać dalsze
informacje na temat
zakażenia wirusem
CMV w ciąży.



Jak diagnozuje się infekcję cCMV?

- 1 Osoba przeprowadzająca badania przesiewowe słuchu noworodków skierowała Twoje dziecko na oddział audiologii w celu dodatkowego badania słuchu. Jest również możliwość wykonania badania na obecność cCMV. Jest to badanie moczu.
- 2 Za Twoją zgodą mocz dziecka zostanie zbadany w ciągu pierwszych 3 tygodni po urodzeniu. Badanie pozwala wykryć obecność cCMV. Próbkę moczu pobiera się zwykle z mokrej pieluszki. Odbywa się to przy użyciu wacika lub w inny podobny sposób. Personel poinformuje Cię o sposobie przeprowadzenia tego badania.
- 3 Sprawdź, czy pielęgniarka pobierająca próbkę ma Twój prawidłowy numer telefonu i adres.

Ujemny wynik badania moczu

Ujemny wynik badania moczu oznacza, że Twoje dziecko nie ma cCMV. Jeśli taki będzie wynik, otrzymasz tę informację listownie.

Pamiętaj: Pomimo ujemnego wyniku nadal należy chodzić z dzieckiem na wszystkie wizyty kontrolne u audiologa.

Dodatni wynik badania moczu

Dodatni wynik badania moczu oznacza, że Twoje dziecko ma wrodzoną infekcję CMV. Co nastąpi po otrzymaniu wyniku:

- 1 Skontaktuje się z Tobą zespół specjalistów Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Rainbow Clinic w CHI Crumlin i Temple St. w celu ustalenia terminu wizyty w poradni.
- 2 Zespół ten zbada Twoje dziecko i zadecyduje, czy leczenie będzie dla niego korzystne.
- 3 Prosimy nadal przyprowadzać dziecko na wszystkie kontrolne badania słuchu, a także na rutynowe wizyty u lekarza rodzinnego. Ważne jest również, aby pamiętać o wizytach u pielęgniarki środowiskowej oraz szczepieniu dziecka według kalendarza szczepień.