

Importante

Si se realiza el análisis de orina a su bebé, recibirá el resultado en un plazo de dos semanas. Si acepta proporcionar una muestra de orina de su bebé, estará aceptando que se analice dicha muestra. Del mismo modo, acepta compartir el resultado con el equipo del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas Pediátricas, Rainbow Clinic, CHI Crumlin y Temple Street. Ellos serán quienes se pongan en contacto con usted para darle los resultados.

Importante:

Si no recibe los resultados en dos semanas,

póngase en contacto con:


✿ El pabellón o unidad del hospital donde dio a luz. Los datos de contacto figuran en la portada de este folleto.

O bien,

✿ The National Centre for Paediatric Infectious Diseases, Rainbow Clinic, CHI Crumlin en el teléfono:
01-409 6338

Citomegalovirus Congénito (cCMV)

Información para padres y tutores



Nombre de la unidad:

Teléfono de la unidad:

Si tiene alguna pregunta, hable con algún miembro del personal.

¿Qué es el Citomegalovirus Congénito (cCMV)? (Citomegalovirus, CMV por sus siglas.)

El CMV es un virus común. En niños y adultos sanos, el CMV generalmente no provoca síntomas. Sin embargo, los bebés nonatos pueden desarrollar problemas de salud si contraen el CMV. “CMV congénito” (cCMV) significa que el bebé nace con la infección por CMV.

¿Cómo se transmite el CMV?

El CMV se transmite de una persona a otra a través del contacto de fluidos corporales. Si está embarazada y contrae el CMV, la infección puede transmitirse a su bebé. Esto es lo que se denomina infección congénita por CMV.

¿Cuáles son los síntomas?

La mayoría de los bebés con cCMV no presenta síntomas al nacer. No obstante, algunos bebés pueden tener complicaciones. Estas podrían incluir pérdida auditiva.

La pérdida auditiva causada por el CMV congénito puede ser leve o grave. Y puede empeorar después del nacimiento.

Si su bebé tiene pérdida auditiva, puede afectar a uno o ambos oídos.

¿Cuál es el tratamiento?

El tratamiento consiste en medicación antiviral. Si se determina que el tratamiento puede beneficiar a su bebé, lo ideal es comenzar antes de las 4 semanas de edad. Un tratamiento temprano ofrece más posibilidades de obtener beneficios a largo plazo.

Para más información sobre el CMV en el embarazo, escanee el código QR



¿Cómo se diagnostica la infección por cCMV?

- 1 El evaluador de audición en neonatos remite al bebé a Audiología para una evaluación de la audición. También se ofrecerá a su bebé una prueba para detectar el cCMV. Se trata de un análisis de orina.
- 2 Con su autorización, se analizará la orina de su bebé durante las primeras 3 semanas después del nacimiento. Hacemos esto para comprobar si existe cCMV. La muestra de orina generalmente se recoge del pañal mojado. Para ello se utiliza un hisopo de algodón u otro método. Le explicaremos el procedimiento.
- 3 Asegúrese de que la enfermera que toma la muestra de orina tiene su número de teléfono y dirección correctos.

Análisis de orina negativo

El análisis de orina negativo significa que su bebé no tiene cCMV. Si este es el resultado, se le enviará una carta.

Recuerde: Seguirá siendo importante que traiga a su bebé a todas las citas de seguimiento en Audiología.

Análisis de orina positivo

El análisis de orina positivo significa que su bebé tiene infección congénita por CMV. Los siguientes pasos serían:

- 1 El equipo de Enfermedades Infecciosas Pediátricas de Rainbow Clinic en CHI Crumlin y Temple St. se pondrá en contacto con usted y concertará una cita en consulta externa.
- 2 El equipo médico examinará a su bebé. Ellos decidirán si el tratamiento puede resultarle beneficioso.
- 3 Le rogamos que continúe llevando a su bebé a todas las pruebas auditivas de seguimiento, así como a las citas rutinarias con su médico [GP]. También es importante llevar a su bebé a las citas con el servicio de enfermería de salud pública [public health nurse]. Esto incluye su vacunación.