



და რეაქციული და დაზავებები

რჩევა მშობლებისა და
მეურვეებისთვის ჯანდაცვის
აღმასრულებელ სამსახურისგან
(HSE)

წყარო: www2.hse.ie/conditions/diarrhoea-babies-children/

ბოლო ვერსია : 2023 წლის 20 ივლისი

ს ი მ კ ტ ო მ ე ბ ი

და რე ა ჩ ვ ი ლ ბ ს ა და ბ ა ვ შ ვ ე ბ შ ი

და რე ა არ ის გა ნ ა ვ ა ლ , რომ ე ლ ც ჩ ვ ე უ ლ ბ რ ი ვ ზ ე უ ფ რ ო წ ყ ლ ა ნ ი და ფ ხ ვ ი ე რ ი ა . ა მ ა ნ შ ე ი ძ ლ ბ ა კ უ ჭ შ ი უ ფ რ ო ხ შ ი რ ა დ გა ს ვ ლ გა მ ო ი წ ვ ი ო ს .

და რე ის 2 ძ ი რ ი თ ა დ ი ტ ი პ ი ა რ ს ე ბ ო ბ ს :

- მ წ ვ ა ვ ე და რე ა
- ქ რ ო ნ ი კ უ ლ და რე ა

მ წ ვ ა ვ ე და რე ა მ ო უ ლ ო დ ნ ე ლ დ ი წ ყ ე ბ ა და 2 კ ვ ი რ ა ზ ე ნ ა კ ლ ბ ი დ რ ო ი თ გ რ ძ ე ლ ლ ე ბ ა . ის ჩ ვ ი ლ ბ ს ა და ბ ა ვ შ ვ ე ბ შ ი უ ფ რ ო ხ შ ი რ ი ა .

ქ რ ო ნ ი კ უ ლ და რე ა 2 კ ვ ი რ ა ზ ე მ ე ტ ხ ა ნ ს გ რ ძ ე ლ ლ ე ბ ა . ჩ ვ ე უ ლ ბ რ ი ვ , ე ს ჯ ა ნ მ რ თ ე ლ ო ბ ის ს ხ ვ ა მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ი თ ა რ ის გა მ ო წ ვ ე უ ლ . ის არ გა ა ქ რ ე ბ ა ს ხ ვ ა მ დ გ ო მ ა რ ე ო ბ ის გა ნ ი კ უ რ ნ ე ბ ა მ დ ე .

მ წ ვ ა ვ ე და რე ის ს ი მ კ ტ ო მ ე ბ ი

ჩ ვ ე უ ლ ბ რ ი ვ , მ წ ვ ა ვ ე და რე ის ს ი მ კ ტ ო მ ე ბ ი 3-დან 5 დ ე მ დ ე გ რ ძ ე ლ ლ ე ბ ა .

ი ს ი ნ ი შ ე ი ძ ლ ბ ა მ ო ი ც ა ვ დ ე ს :

- ფ ხ ვ ი ე რ ა ნ წ ყ ლ ა ნ გა ნ ა ვ ა ლ ს
- დ ე შ ი 3-ზე მ ე ტ ჯ ე რ კ უ ჭ შ ი გა ს ვ ლ ს
- ლ ე ბ ი ნ ე ბ ა ს ა ნ ა ვ ა დ მ ყ ო ფ ო ბ ა ს
- [მ ა ლ ა ლ ტ ე მ კ ე რ ა ტ უ რ ა ს](#)
- მ უ ც ლ ს ტ კ ი ვ ი ლ ბ ს
- გა უ წ ყ ლ ო ე ბ ა ს

გ ა უ წ ყ ლ ო ე ბ ა

თ ქ ვ ე ნ ს შ ვ ი ლ ს შ ე ი ძ ლ ბ ა ჰ ქ ო ნ დ ე ს გა უ წ ყ ლ ო ე ბ ა , თუ მ ა ს ძ ლ ე რ ი და რე ა ა ნ ლ ე ბ ი ნ ე ბ ა ა ქ ვ ს .

თ ქ ვ ე ნ ს ე ქ ი მ ს და უ ყ ო ვ ნ ე ბ ლ ვ და უ კ ა ვ შ ი რ დ ი თ ა ნ უ ა ხ ლ ო ე ს ს ა ა ვ ა დ მ ყ ო ფ ო ს ე წ ვ ი ე თ , თუ:

- თ ქ ვ ე ნ ს შ ვ ი ლ ს ძ ლ ე რ ი გა უ წ ყ ლ ო ე ბ ის რ ა ი მ ე ნ ი შ ა ნ ი ა ქ ვ ს

გა უწყლოების ნიშნები უფრო სავარაუდო იმ ბავშვებშია, რომლებიც:

- 1 წლამდე ასაკის არიან
- ძუძუთი კვებაზე არიან და კვება უწყდებათ
- სითხეებს არ სვამენ
- შეუძლოდ არიან ჯანმრთელობის სხვა გრძელვადიანი პრობლემების გამო

გა უწყლოების სიმპტომები მოიცავს:

- ჩვეულებრივზე ნაკლები შარდვა
- სისუსტე
- ჩვეულებრივზე ნაკლები ენერგიულობა
- გაღიზიანებადობა
- ტირილსას ნაკლები ცრემლი
- მშრალი პირი, ტუჩები და ენა
- თქვენი ბავშვის თავზე რბილი ადგილი (ყიფლობანი) ჩაწეულია

მძიმე გა უწყლოება უფრო სავარაუდოა, თუ თქვენს ბავშვს ჰქონდა:

- 24 საათში დიარეის ნაწილი შეტევა
- 24 საათში 3 ან მეტი ლებინება

როდის უნდა მიმართოს ამ ედიცინო დახმარებას

ჩვილებისა და ახალშობილებს ბავშვების უმეტესობა დიარეისგან ექიმთან ვიზიტის გარეშე გამოჯანმრთელდება.

რჩევების თქვენს ექიმს მიმართეთ, თუ თქვენს ბავშვ(ი)ს:

- 24 საათის განმავლობაში დიარეა 6-ზე მეტჯერ ჰქონდა
- განავალში სისხლი ან ლორწოა
- 24 საათის განმავლობაში ლებინება 3-ზე მეტჯერ ჰქონდა
- გა უწყლოების ნებისმიერ სიმპტომს ავლენს
- დიარეა 7 დღის შემდეგ აქვს
- აქვს დიარეა და საზღვარგარეთ მოგზაურობიდან ახლხან დაბრუნდა

თქვენი ბავშვი გა და უდებელ და ხმარების განყოფილებაში სასწრაფოდ წაიყვანეთ, თუ:

- მძიმე გა უწყლოების რაიმე სიმპტომი აქვს
- მაღალ ტემპერატურა აქვს, რომელიც არ იწევს
- მდგომარეობა სწრაფად უარესდება
- მუცლის ძლიერი ტკივილი აქვს

უფროსი ასაკის ბავშვი შეძლებს გითხრათ, მუცლის ძლიერი ტკივილი აქვს, თუ არა. უმცროსი ბავშვი და ჩვილი ამას ვერ შეძლებს. თუ ის ტირილს არ შეწყვეტს, ეს შეიძლება იყოს იმის ნიშანი, რომ ტკივილი აქვს.

3 თვემდე ჩვილებისთვის, მაღალ ტემპერატურა ცელსიუსით 38 გრადუსი და მეტია. 3 თვეზე უფროსი ჩვილებისთვის, მაღალ ტემპერატურა ცელსიუსით 39 გრადუსი და მეტია.

მკურნალობა

დაარეა ჩვილებსა და ბავშვებში

თქვენი ბავშვის სახლში მკურნალობა უსაფრთხოა, თუ მას მწვავე დაარეა ან გა უწყლოება არ განუვითარდება.

თქვენი ბავშვის სიმპტომების სახლში შემცირება შეგიძლიათ:

- თუ რძით ხვდებით კვებას განაგრძობთ
- მას ბევრ წყალს მიაღებინებთ მცირე ყლუპებით
- განაგრძობთ მისთვის მცირე რაოდენობით საკვების შეთავაზებას — არინერვიულოთ, თუ თქვენს ბავშვს 1 ან 2 დღის განმავლობაში ჭამა არ სურს
- კვება ვთმას მოუხდელი რძით და ბოჭკოებით, თუ ის 12 თვეზე უფროსია
- დაალვინებთ მას [თხევადპარაცეტამოლს](#), რათა შეუმციროთ [მაღალ ტემპერატურა](#) ან შეუმსუბუქოთ მუცლის ტკივილი

მნიშვნელოვანია

ეტიკეტი ყოველთვის წაიკითხეთ და თხევადი პარაცეტამოლის სწორი დოზა მიეცით. ყველ წამალ თქვენი ბავშვისთვის მიუწვდომელ ადგილს შეინახეთ.

დარეის მქონე ბავშვების უმეტესობას ანტიბიოტიკები არ სჭირდება. ეს იმიტომ, რომ დარეა, ჩვეულებრივ, ვირუსითაა რის გამოწვეული. ანტიბიოტიკები ვირუსებს ვერ მკურნალობს.

თუ თქვენს ბავშვს დარეა აქვს

თუ თქვენს ბავშვს დარეა აქვს, არ მისცეთ:

- ხილს წვეწვები ან გაზიანი სასმელები
- დარეის შესაჩერებელ მედიკამენტები
- განზავებული ფორმულა

მნიშვნელოვანია

ფორმულს მომზადებისას ყოველთვის პაკეტის ინსტრუქციას მიჰყევით. საბავშვონარევში ზედმეტი წყლს დამატებით განზავება უსაფრთხო არ არის. ბოთლები ჩვეულებრივად მოამზადეთ და თქვენს პატარას რძის საკვების გარდა დამატებითი წყალს ან სასმელო მიეცით.

მიზეზები

დარეა ჩვილებსა და ბავშვებში

დარეა ხშირად კუჭის ინფექციითაა რის გამოწვეული. დარეით დაავადებულ ბავშვების უმეტესობის სახლში მოვლ შესაძლებელია და ისინი რამდენიმე დღეში გამოჯანმრთელდებიან.

მწვავე დარეა

მწვავე დარეის ყველზე გავრცელებული მიზეზი ინფექციაა.

ეს შეიძლება სხვადასხვა გზით გავრცელდეს, მაგალითად:

- სხვა ადამიანებისგან
- საკვებით მოწამვლა
- დაბინძურებული წყალი

ინფექცია

მწვავე დიარეა ყველზე ხშირად ინფექციითაა რის გამოწვევულ, რომელიც შეიძლება ადამიანიდან ადამიანზე გადაეცეს.

მწვავე დიარეის გამომწვევი ინფექციები ყველზე ხშირად ვირუსებითაა რის გამოწვევულ. მაგალითად, [ნოროვირუსი](#) ([ზამთრის ლებინების ვირუსი](#)) და როტავირუსი.

ირლანდაში 2016 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ დაბადებულ ყველ ბავშვი როტავირუსის წინააღმდეგ არის აცრილ.

დიარეა ასევე შეიძლება ისეთი ბაქტერიებით იყოს გამოწვევულ, როგორცაა:

- [ნაწლავის ჩხირი](#)
- [კამპილობაქტერია](#)
- [სალმონელა](#)
- შიგელოზი

პარაზიტებს, როგორცაა კრიპტოსპორიდიუმი და გიარდიაზი, ასევე შეუძლავთ დიარეის გამოწვევა.

საკვებით მოწამვლა

მიკრობებით დაბინძურებულმა საკვებმა შეიძლება დიარეა გამოიწვიოს.

საკვებით მოწამვლას [ტიპები](#) მოიცავს:

- სალმონელა
- კამპილობაქტერია
- ნაწლავის ჩხირი
- გიარდიაზი

დაბინძურებულ წყალს

მიკრობებით დაბინძურებულ წყალს და ლევითოქსენი ბავშვი შეიძლება დაავადდეს.

მიკრობების ტიპები მოიცავს:

- ნაწლავის ჩხირი
- კრიპტოსპორიდიუმი
- კამპილობაქტერია

ეს უფრო ხშირი იმ ქვეყნებშია, სადა ცუდი სანიტარული პირობებია.

ირლანდიაში საზოგადოებრივი წყალმომარაგება მიკრობების მოსაკლავად ქიმიკატებითაა და მუშავებული. მაგრამ კერძო ჭაბურღილები შეიძლება დაბინძურდეს, თუ ისინი დაცული და მუშავებული არ არის.

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი ჭაბურღილს წყალ დაბინძურებულია, გარემოს დაცვის სააგენტოს და უკავშირდით.

მნიშვნელოვანია
თუ ფიქრობთ, რომ თქვენი წყალ შეიძლება დაბინძურებული იყოს, დასალევად, საჭმლად მოსამზადებლად, რძის ნარევების მოსამზადებლად და კბილების გასახეხადის

ქრონიკული დიარეა

როგორც წესი, ქრონიკული დიარეა ინფექციითაა რაის გამოწვეული. ის უფრო იშვიათია, ვიდრე მწვავე დიარეა და შეიძლება ჯანმრთელობის ძირითადი პრობლემის ნიშანი იყოს, როგორცაა:

- [საკვებზე ალერგია ან საკვების აუტანლობა](#)
- წვრილ ნაწლავის და რღვევები, როგორცაა კოლიკა ან მოკლე ნაწლავის სინდრომი
- ნაწლავის ანთება (კოლტი)

თქვენი ბავშვი ექიმთან, ფარმაცევტთან ან საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ექთანთან წაიყვანეთ, თუ:
<ul style="list-style-type: none">• მას დიარეა აქვს, რომელიც 7-დან 10 დღემდე გრძელდება

პატარა ბავშვის დიარეა

პატარა ბავშვთა დიარეა ქრონიკული დიარეის ტიპია, რომელიც შეიძლება პატარა ბავშვებს შეეყაროს. ჩვეულებრივ, ეს სერიოზული არ არის. თქვენი ბავშვი თავს კარგად შეიძლება მაშინაც კი გრძნობდეს, თუ მას დიარეა აქვს.

პატარა ბავშვის დიარეაში ხშირად ნახავთ მოუნელებელ საკვებს, როგორც ბარდა და ტკბილ სიმინდას.

თუ ფიქრობთ, რომ თქვენს ბავშვს პატარა ბავშვის დიარეა აქვს, ეცადეთ, რომ მან საკმარისი სითხე დალოს. თქვენი შვილი ექიმთან მიიყვანეთ, რომელიც და რწმუნდება, რომ ის კარგად იზრდება.

სხვა რჩევები, რომლებიც შეიძლება დაგეხმაროთ, მოიცავს:

- თქვენს პატარას ხილს წვენები ან ხილს პიურე არ შესთავაზოთ
- და რწმუნდით, რომ მის კვებაში ცხიმების საკმარისი რაოდენობა შედის, როგორცაა რძე, ან იოგურტი
- და რწმუნდით, რომ ის [ჯანმრთელობა ღონსებულ კვებაზეა](#) ხილთ და ბოსტნეულთ

პრევენცია

დიარეა ჩვილებსა და ბავშვებში

დიარეის თავიდან ასაცილებლად საუკეთესო საშუალებაა, ხელბის კარგად დაბანა და გაშრობა. ყოველთვის საპონი და თბილ წყალ გამოიყენეთ. თუ წყალ ხელისაწვდომი არ არის, ხელს სადეზინფექციო საშუალება გამოიყენეთ.

[თქვენი ბავშვის ძუძუთი კვებას](#) დიარეის რისკის შემცირება შეუძლია.

საზღვარგარეთ მოგზაურობისას შეეცადეთ, თავიდან აიცილოთ:

- ონკანის სასმელო წყალ
- სასმელები, რომლებიც ყინულს შეიცავს
- წყალში მომზადებული საკვები, როგორც ონკანის წყალთ გარეცხილ სალთებია

დარწმუნდით, რომ თქვენი ბავშვის [ვაქცინები აქტუალურია](#).

დიარეის გავრცელების შეჩერება

ბევრი მიკრობი, რომლებიც დიარეას იწვევს, ადამიანიდან ადამიანზე ადვილდვრცელდება. არსებობს ბევრი რამ, რისი გაკეთებაც დიარეის გავრცელების შესაჩერებლად შეგიძლიათ.

მნიშვნელოვანია თქვენი ბავშვი სახლში უნდა დარჩეს და სკოლაში, საბავშვო ბაგაში ან საბავშვო ბაღში მანამ არ უნდა წავიდეს, სანამ დიარეისა და ლებინების ბოლო ეპიზოდიდან, სულმცირე, 48 საათი გავა.
--

ხელბისათნადოდ დაიბანეთ და გაიმშრალეთ

თქვენ და თქვენმა ბავშვმა [ხელბი საგულდაგულოდ უნდა დაიბანოთ](#) საპნით და თბილ წყალთ.

შემდეგ სიტუაციებში ხელბი ყოველთვის დაიბანეთ:

- საფენის გამოცვლას შემდეგ
- ბავშვებისთვის ტუალეტის გამოყენებაში და ხმარების შემდეგ
- ქოთანზე შეხების ან მისი გაწმენდის შემდეგ
- საჭმელს მომზადებამდე, დამუშავებამდე ან ჭამამდე

- ნაგვის ურნების და ჭუჭყიანი საფენების დამუშავების შემდეგ
- უმი ხორცის დამუშავების შემდეგ
- ცხოველების ან მათი ნარჩენების დამუშავების შემდეგ

ხელები და ხანის შემდეგ ყოველთვის სათანადოდ გაიმშრალეთ.

აბაზანის უფთავების დიქონი

თუ ოჯახის წევრს დარეა აქვს, აბაზანის გაწმენდა მნიშვნელოვანია.

ცხელ წყალს, სადეზინფექციო საშუალებას და ერთჯერადი ტილოები გამოიყენეთ, რომ გაწმინდოთ:

- ტუალეტი
- ნიჟარა
- აბაზანის ზედაპირები
- კარის სახელები
- ტუალეტის დასაჯდომი
- ჩამრეცხის სახელები

როცა საქმეს დაასრულებთ, ხელები ყოველთვის საგულდაგულად დაიბანეთ და გაიმშრალეთ.

დაბინძურებული ზედაპირები გარეცხეთ

თუ ლებინების გამოავიჯიან იატაკი და ბინძურდა, შემდეგი გააკეთეთ:

- ზედმეტი სითხე ქაღალდის პირსახოცებით მოშორეთ
- ზედაპირის სარეცხი საშუალებით და წყლთკარგად გარეცხეთ
- ადგილს უფთავ წყლთ ჩამორეცხეთ
- ადგილს გააშრეთ
- გამოყენებული ხელთახანები და აღჭურვილობა გადაყართან კარგად გარეცხეთ
- ხელები დაიბანეთ და გაიმშრალეთ

თუ საწოლი, ან ტანსაცმელი განავლთან ნაღებინართარის და ბინძურებული, ყველფერი, რასაც შეძლებთ, ტუალეტში გაიტანეთ. შემდეგ ნივთები ცალკე, სარეცხ მანქანაში, მაღალ ტემპურ ტურაზე გარეცხეთ.

დიარეის გავრცელების შეჩერების სხვა გზები

თქვენი ბავშვი სახლში და ტოვებთ და სკოლაში, საბავშვო ბაგაში, ან საბავშვო ბაღში მანამ არ გაუშვით, სანამ დიარეისა და ლებინების ბოლო ეპიზოდი დასრულდეს, სულმცირე, 48 საათი გავა.

შემდეგი რჩევები დარეის გავრცელების შემცირებაში დაგეხმარებათ:

არმისცეთ

- × დაავადებულა და მძინებს საკვების მომზადების საშუალება
- × თქვენს ავადყოფნა ვშვს უფლება, პირსახოცები სხვებს გაუზიაროს