



მაღალი ტემპერატურა — ცხელება ბავშვებში

რჩევა მშობლებისა და
მეურვეებისთვის ჯანდაცვის
აღმასრულებელი სამსახურისგან
(HSE)

წყარო: www2.hse.ie/conditions/high-temperature/

ბოლო ვერსია : 2021 წლის 20 დეკემბერი

მაღალტემპერატურა — ცხელება ბავშვებში

ნორმალური ტემპერატურა ცელსიუსით 36 და 36,8 გრადუსს შორისაა.

ბავშვებში, ცელსიუსით 38 გრადუსი და მეტი ტემპერატურა განიხილება, როგორც მაღალტემპერატურა მცირეწლოვან ბავშვებში ხშირია. ჩვეულებრივ, ტემპერატურა ნორმას 3 ან 4 დღეში უბრუნდება.

ცელსიუსით 38 გრადუსზე მაღალტემპერატურა, როგორც წესი, ინფექციის ნიშანია, როგორც გაციებაა. მაგრამ ეს შეიძლება უფრო სერიოზული ინფექციებით იყოს გამოწვეული, ამიტომ თქვენი ბავშვის ყველ სიმპტომის გათვალისწინება მნიშვნელოვანია.

მაშინაც კი, თუ მას მაღალტემპერატურა არაქვს, შესაძლოა მიიმედიყოს დაავადებულ.

ბავშვებში მაღალტემპერატურის სიმპტომები

ჩვეულებრივ, მაღალტემპერატურა მცირე დაავადებებით არის გამოწვეული. მაგრამ ისინი შეიძლება სერიოზული ინფექციების ნიშანი იყოს. მნიშვნელოვანია დარწმუნდეთ, რომ თქვენი ბავშვი ყურადღებას იჩენს და თქვენს მოქმედებებზე რეაგირებს.

სამედიცინო დახმარებას სასწრაფოდ მიართეთ, თუ:

- შიშობთ, რომ თქვენი ბავშვი შეიძლება სერიოზულ დაავადიყოს, თუნდაც მაღალტემპერატურა არ ჰქონდეს

თქვენი ბავშვი შეიძლება იყოს ავად, თუნდაც მაღალტემპერატურა არ ჰქონდეს.

სერიოზული ავა დემოფობიის რისკი დაბალია, თუ თქვენი ბავშვი:

- კმაყოფილია და იღიმის
- ფხიზლ დაა
- სითხეს იღებს
- ხალხთან ჩვეულბრივ ურთიერთობს

სერიოზული დაავადების მაღალი რისკი არსებობს, თუ თქვენი ბავშვი:

- ვერიღვიძებს და თუიღვიძებს, ფხიზლ დდა რჩენას ვეღარ ახერხებს
- სუსტადან მაღალი ტონით უწყვეტად ტირის
- აქვს ფერმკრთალო ან ლქებიანი კანი
- ღებინებას აგრძელებს
- ხიხინებს, თუ ჩვილია, ან ძალიან სწრაფადსუნთქავს

ტემპერატურის შემოწმება

თუ თქვენს ბავშვს მაღალი ტემპერატურა აქვს, ის შეიძლება:

- შუბლზე, ზურგზე, ან მუცელზე შეხებისას, ჩვეულბრივზე ცხელი იყოს
- ოფლიანი და სველი იყოს
- მას შეიძლება წითელი ლოყები ჰქონდეს

ციფრული თერმომეტრი

ბავშვის ტემპერატურის შესამოწმებლ დასაუკეთესო საშუალება ციფრული თერმომეტრია.

ციფრული თერმომეტრის შეძენა აფთიაქში, სუპერმარკეტში ან ინტერნეტით შეგიძლიათ. თერმომეტრს ინსტრუქცია მოყვება.

თქვენი ბავშვის ტემპერატურა დაბანის შემდეგ ან, როდესაც ის თბილტანსაცმელშია გახვეული, არ გაზომოთ. ზუსტ შედეგს ვერ მიიღებთ.

ბავშვის მკურნალობა ცხელების დროს

ცხელება რაიმე სერიოზულის ნიშანი იშვიათადაა.

ჩვეულბრივ, თქვენს ბავშვზე ან ჩვილზე ზრუნვა სახლიშეგიძლიათ. ტემპერატურა 3-4 დღის განმავლობაში უნდა დაეცეს.

თქვენ უნდა :

- თქვენს ბავშვს ნორმალურად ჩააცვით, ზედმეტს ნუ ჩააცმევთ და ტანსაცმელი ზედმეტად არ გადაახვიოთ
- თქვენს ბავშვს ბევრი სითხე მიეცით
- თქვენს ბავშვს, თუ მას სურს, საკვები მიეცით
- თქვენი ბავშვი დამითრეგულ რულ დშეამოწმეთ

მისი ტემპერატურის შესამცირებლად, გრილი ქსოვილი ან ღრუბელი არ გამოიყენოთ.

სიცხის დამწვევი მედიკამენტები

თქვენი ბავშვის ტემპერატურის შესამცირებლად და ტკივილს შესამსუბუქებლად პარაცეტამოლი, ან იბუპროფენი გამოიყენეთ. რჩევისთვის თქვენს ფარმაცევტს მიმართეთ.

12 წლამდე ასაკის ბავშვებს ასპირინი არ მისცეთ.

თქვენი ბავშვისთვის პარაცეტამოლი ან იბუპროფენის მიცემით დაიწყეთ. თუ ის წამალი, რომელიც მიეცით, არ შველს, მეორე სცადეთ.

და რწმუნდით, რომ :

- პარაცეტამოლი თითოეულ დოზას შორის 4-დან 6 საათამდე გავიდა
- იბუპროფენის თითოეულ დოზას შორის 6-დან 8 საათამდე გავიდა

თქვენი ბავშვის წონის მიუხედავად რეკომენდებული დოზა ზემეტი არ მისცეთ.

თქვენ შეგიძლიათ, თქვენს ბავშვს პარაცეტამოლი და იბუპროფენი მისცეთ, თუ ის ანტიბიოტიკს იღებს. ანტიბიოტიკი სიცხეს არ შეამცირებს და ტკივილს არ მოხსნის.

როდის უნდა მიმართოთ დახმარებას

სასწრაფოდექიმს მიმართეთ, თუ თქვენი ბავშვი:

- არის 3 თვეზე ნაკლების და ცელსიუსით 38 გრადუსი ან უფრო მაღალი ტემპერატურა აქვს, ან ფიქრობთ, რომ მას ცხელება აქვს
- არის 3-დან 6 თვემდე ასაკის და ცელსიუსით 39 გრადუსი ან უფრო მაღალი ტემპერატურა აქვს, ან ფიქრობთ, რომ მას ცხელება აქვს
- დაავადების სხვა ნიშნები აქვს, როგორცაა გამონაყარი, ასევე მაღალი ტემპერატურა
- მაღალი ტემპერატურა აქვს, რომელიც 5 დღეზე მეტხანს გრძელდება
- ჭამა არსურს ან უჩვეულოდ იქცევა და ამის გამო, თქვენ დღევით
- მაღალი ტემპერატურა აქვს, რომელიც პარაცეტამოლის, ან იბუპროფენის მიღებისას არ იკლებს. აუცილებელი არაა, რომ ტემპერატურა ნორმამდე ჩამოვიდეს, ცელსიუსით 38 გრადუსი ნორმალურია. ინფექციის უმეტესობისას, ბავშვებს, როგორც წესი, ტემპერატურა მინიმუმ 3 დღის განმავლობაში აქვთ
- გაუწყლებების ნიშნებს ავლენს - როგორცაა საფენები, რომლებიც ძალანსველი არ არის, ჩაცვებილი თვალები და უცრემლო ტირილი

112-ზე ან 999-ზე დარეკეთ, ან სასწრაფო დახმარების განყოფილებაში (ED) წადით, თუ თქვენს ბავშვს:

- აქვს სიცხე, რომელსაც ვერაკონტროლებთ
- კისერი დაჭიმული აქვს
- აქვს გამონაყარი, რომელიც ჭიქითმიჭერის შემდეგაც არ ქრება
- სინათლე აწუხებს
- შეტევა პირველ დაქვს
- უჩვეულოდცივი ხელფეხი აქვს
- ფერმკრთალი, ლქებიანი, ლურჯი, ან ნაცრისფერი კანი აქვს
- აქვს სუსტი, მაღალტონიანი ტირილი, რომელიც მის ჩვეულებრივ ტირილს არ ჰგავს
- ძილანობა აქვს და ძნელ დიდვიძებს
- სუნთქვა უჭირს და მუცელს ნეკნების ქვეშ იწოვს
- თავზე რბილი ადგილი აქვს, რომელიც გარეთარის გამობურცული (გამობურცული კვანძი)

კოვიდ-19

ცხელება (მაღალტემპერატურა - ცელსიუსით 38 გრადუსი, ან მეტი) შეიძლება COVID-19-ის სიმპტომი იყოს.

სკოლში დაბრუნება

თქვენი ბავშვი სკოლში ან საბავშვობაღმისარგაუმვათ, თუ მაღალტემპერატურა აქვს.

მას შეუძლია დაბრუნდეს, თუ თავს კარგადგრძნობს და 48 საათის განმავლობაში, მაღალტემპერატურა ან რაიმეახალ სიმპტომები არ აღენიშნება.

თუ თქვენს ბავშვს ღებინება ან დიარეა აქვს, ღებინების, ან დიარეის ბოლო შეტევიდან 48 საათის განმავლობაში, ის სკოლში არ უნდა დაბრუნდეს.