



د بدن لوړه تودوخه - په ماشومانو کې تبه

د روغتيايي خدماتو وړاندې کوونکو (HSE) لخوا د والدينو او
سرپرستانو لپاره مشوره

سرچينه: www2.hse.ie/conditions/high-temperature

په ورستي ځل بياکتل شوی: 20 ډسمبر 2021

د بدن لوړه تودوخه - په ماشومانو کې تبه

نورمال تودوخه د 36 او 36.8 سلسیوس درجو تر منځ ده.

په ماشومانو کې هر ډول 38 یا تر دې لوړه سلسیوس درجې تودوخه لوړه گڼل کېږي. لوړه تودوخه په کوچنیو ماشومانو کې عامه ده. تودوخه معمولاً په 3 یا 4 ورځو کې نورمال حالت ته راگرځي.

تر 38 سلسیوس درجو لوړه تودوخه معمولاً د یوه انتان نښه ده لکه زکام. خو کېدی شي د لا زیاتو جدي انتانونو له امله وي، پر دې اساس مهمه ده چې ستاسو د ماشوم ټولې نښې نښانې وکتل شي.

حتی که ماشومان لوړه تودوخه ونه لري، بنایي لا هم جدي ناروغ وي.

په ماشومانو کې د لوړې تودوخې نښې نښانې

لوړه تودوخه معمولاً د کوچنیو ناروغیو له امله رامنځته کېږي. خو کېدی شي د جدي انتانونو نښه وي. دا مهمه ده چې وکتل شي چې ماشوم مو فعال دی او تاسو ته ځواب درکوي یعنی غبرگون نښي.

ژر تر ژره طبي مرسته ترلاسه کول، که:

- تاسو اندېښنه لرئ چې ماشوم مو بنایي جدي ناروغ وي حتی که لوړه تودوخه هم ونلري
- ماشوم مو حتی له لوړې تودوخې پرته بیا هم کېدی شي ناروغ وي.

د جدي ناروغیو کم خطر شتون لري، که ستاسو ماشوم:

- راضي وي او موسکا کوي
- وینې پاتې کېږي
- ځنډاک کوي
- خلکو ته په نورمال شکل ځواب ورکوي

د جدي ناروغیو لوړ خطر شتون لري، که ستاسو ماشوم:

- وینې نه شي یا که وینې شي، نو وینې نه پاتې کېږي
- ورو یا په ډېر لوړ غږ دوامداره ژاري
- رنگ يې الوتلی وي یا يې پوستکی سور شوی وي
- کانگې کوي
- غر، غر کوي، که کوچنی ماشوم وي یا په تېزۍ سره ساه اخلي

د تودوخي کتل

که مو ماشوم لوړه تودوخه ولري، بنایي هغه:

- پر تندي، شا یا د گېډې په لمس کولو سره تر نورمال حالت څخه ډېر گرم ښکاري
- خولې یا مرطوب ښکاري
- غومبوري يې سره وي

ډیجیټل ترمامیټرونه

د خپل ماشوم د تودوخي کتلو تر ټولو ښه لار په ډیجیټل ترمامیټرونو سره کتل دي.

کولی شئ یو برېښنايي ترمامیټر په درملتون، سوپرمارکېټ کې او یا هم انلان وپېرئ. ترمامیټر به لارښوونې ولري. ماشوم ته تر حمام ورکولو یا کله چې په گرمو کالیو کې تاو شوی وي، نو سملاسي يې تودوخه مه کورئ. کره پایله به ترلاسه نه کړئ.

تبه لرونکي ماشوم لپاره درملنه

په ندرت سره داسې پېښې چې تبه دې د یو جدي شي نښه وي.

تاسو معمولاً کولی شئ د خپل ماشوم څخه په کور کې پاملرنه وکړئ. تودوخه باید د 3 یا 4 ورځو په تېرېدو سره راکمه شي.

تاسو باید:

- ماشوم ته په نورمال بڼه جامې ور واغونډئ - جامې مه ترې وباسئ یا يې په جامو کې يې تر حده زیات مه تاوئ.
- خپل ماشوم ته کافي اندازه مایعات ورکړئ
- ماشوم ته خواړه ورکړئ، که يې غواړي
- د شپې لخوا مو خپل ماشوم په منظم ډول وگورئ

د ماشوم د تودوخي راکمولو لپاره سړي جامې سا سفنج مه کاروئ.

د تبي د درملني لپاره درمل

د خپل ماشوم د تودوخي راکمولو او درد ارامولو لپاره پراستامول (paracetamol) یا ایبروفېن (ibuprofen) وکاروئ. د مشورې لپاره له خپل فارمسټ سره خبرې وکړئ.

تر 12 کلونو کم عمره ماشوم ته اسپرین (aspirin) مه ورکوئ.

ماشوم ته په پراستامول یا ایبروفېن سره پیل وکړئ. که هغه درمل چې پیل مو پرې کړی، کار نه کوي نو دا بل یو وازموئ.

ډاډ ترلاسه کړئ چې:

- د پراستامول د هر ډوز تر منځ له 4 څخه تر 6 ساعتونو پورې وخت ورکړئ
- د ایبروفېن د هر ډوز تر منځ له 6 څخه تر 8 ساعتونو پورې وخت ورکړئ

د خپل ماشوم د وزن لپاره تر سپارښتنل شوي اندازې ډېر درمل مه ورکړئ.

کولی شئ خپل ماشوم ته پراستامول يا ايپروفېن ورکړئ، که انتي بيوتیک خوري. انتي بيوتیک تبه نه راکموي يا درد نه اراموي.

څه وخت مرسته ترلاسه کړئ

له عمومي معالج (GP) سره سملاسي اړیکه ونیسئ، که ستاسو د ماشوم:

- عمر تر 3 میاشتو کم وي او 38 يا تر دې لوړه سلسیوس درجه تودوخه ولري يا تاسو فکر کوئ چې تبه لري
- عمر له 3 څخه تر 6 میاشتو پورې وي او 39 يا تر دې لوړه سلسیوس درجه تودوخه ولري يا تاسو فکر کوئ چې تبه لري
- د ناروغۍ نورې نښې نښانې لري لکه بخار او همدارنگه لوړه تودوخه
- داسې لوړه تودوخه ولري چې تر 5 ورځو يې ډېر دوام کړی وي
- نه غواړي چې خوراک وکړي يا يې حالت نورمال نه وي او تاسو اندېښنه لرئ
- داسې لوړه تودوخه لري چې په پراستامول يا ايپروفېن سره نه راکمېږي. اړینه نه ده چې تودوخه دې نورمال ته رابنکته شي، 38 سلسیوس درجې سمه ده. ماشومان معمولاً له ډېرې انتانونو سره تر 3 ورځو پورې تودوخه لري.
- د بدن د ابو کموالي نښې داسې دي - لکه د پمپرونو ډېر نه لوندیيل، سترگې يې ننوتې وي او د ژړا پر مهال يې اوبښکې نه راځي
- وروسته له تر ترلاسه شوي مشورې لا زیات ناروغ يا نه ښه کيږي

112 يا 999 شمېرې ته ټنگ ووهئ يا بېړنۍ څانگې (ED) ته ورشئ، که مو ماشوم:

- داسې تبه ولري چې تاسو يې نه شئ کنټرولولای
- غاړه يې سخته وي
- داسې بخار ولري چې بنښنه پرې کپکاري بيا هم نه ورکيږي
- رڼا يې تکلیفوي
- د لومړي ځل لپاره ميرگي ولري
- غیر معمولي ساره لاسونه يا پښې ولري
- رنګ يې الوتې وي، پوست يې لکه ولري، سور، شين يا سپيره شوی وي
- يو کمزوري، داسې لور غږ ژړا ولري چې د عادي ژړا په څېر نه وي
- خوبولی وي يا په سختی سره را وپښېږي
- په سختی سره ساه وباسي او تر خپلو پښتنيو لاندې په خيټه لاس وهي
- په سر کې يې داسې نرم ځای وي چې پرسيدلی وي (بهر ته راوتی فونټانيلی)

کووید -19

تبه (لوره تودوخه - 38 یا تر دی لور سلسیوس درجی) د کووید -19 تبه کېدی شي.

بېرته بڼوونځي ته تگ

لوره تودوخه لرونکی ماشوم بڼوونځي یا وړکتون ته مه لېږئ.

یاد ماشومان بیا راتلی شي، که تبه احساس کوي او د 48 ساعتونو لپاره یې لوره تودوخه یا هر ډول نوي نښې نښانې نه وي لرلي.

که ستاسو ماشوم کانګي کوي یا اسهال وي، باید تر هغه پورې بڼوونځي ته رانه شي خو چې د کانګو یا اسهال د وروستی حملې 48 ساعته پوره شوي نه وي.