

Pas Imdhíonta

do leanaí a rugadh ar an 1 Deireadh Fómhair 2024 nó ina dhiaidh



Ainm

Dáta
breithe

Is doiciméad tábhachtach é seo agus ba cheart é a choimeád in áit shábháilte.



Tús Eolais

Is é aidhm an Phas Imdhíonta seo ná a chinntiú go bhfuil taifead agat ar d'imeadh go léir.

Ba cheart iad seo a leanas ar fad a chuimsiú sa taifead seo

- príomh-imdhíonadh óige,
- imdhíontaí scoile,
- vacsaíní séasúracha
- vacsaíní eile

D'fhéadfaí go mbeadh vacsaíní eile ag teastáil uait ó am go chéile tar éis ráige galair nó le haghaidh oibre nó taistil. Is féidir na vacsaíní sin a chlárú sa leabhrán seo freisin.

Tabhair an Pas Imdhíonta seo leat gach uair a fhreastalaíonn tú ar choinne imeadh, le do thoil.

Ainm

Aitheanta chomh
maith mar

Dáta Breithe

Seoladh

Uimhir
Theagmhála

Seoladh
Ríomhphoist

Ailléirgí

Ainm
an Dochtúra

Seoladh an
Dochtúra

Uimhir Fóin
an Dochtúra

Ainm
an Dochtúra

Seoladh
an Dochtúra

Uimhir Fóin
an Dochtúra

Ainm
an Dochtúra

Seoladh
an Dochtúra

Uimhir Fóin
an Dochtúra

**Coinnigh an leabhrán seo in áit shábháilte agus
tabhair leat é chuig gach coinne vacsaínithe.**

Léiríonn an tábla thíos cén aois ag a ndéantar imdhíonadh ar leanaí, cá háit a ndéantar é agus cé na vacsaíní a bhíonn i gceist.

Cathain

Cá háit

Vacsaíniú

2
mhí

Lialann
Cuairt 1

6 in 1+PCV+MenB+Rótaivíreas
3 instealladh + Braonta Béil

4
mhí

Lialann
Cuairt 2

6 in 1+MenB+Rótaivíreas
2 instealladh + Braonta Béil

6
mhí

Lialann
Cuairt 3

6 in 1+PCV
2 Instealladh

Ní thugtar vacsaín rótaivíris ag
8 mí 0 lá nó ina dhiaidh sin

12
mhí

Lialann
Cuairt 4

MMR+MenB+Deilgneach
3 Instealladh

13
mhí

Lialann
Cuairt 5

6 in 1+MenC+PCV
3 Instealladh



Naíonáin shóisearachas (an chéad bhliain sa bhunscoil)	Scoil*	4 in 1 + MMRV
An chéad bhliain den mheánscoil	Scoil	HPV + Tdap + MenACWY
Gach bliain (Vacsaíní Séasúracha)	Clinic Dochtúra Ghinearálta nó Cógaslann	Fliú**

* Níl na vacsaíní seo le fáil i gClinicí DG ach amháin i Sligeach, Liatroim agus Dún na nGall.

** Do leanaí 2 bhliain d'aois agus níos sine, aoisghrúpaí incháilithe eile agus grúpaí atá i mbaol

6 in 1	Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitíteas B, Triuch, Póilió, Teiteanas
PCV	Comhchuingeach níumacocúil
MenB	Ionfhabhtú Meiningeacocúil B
Rótai	Rótaivíreas
MenC	Ionfhabhtú Meiningeacocúil C
MMR	Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg
Deilgneach	Varicella
MMRV	Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg, Deilgneach (Varicella)
4 in 1	Diftéire, Triuch, Póilió, Teiteanas
HPV	Papalómaivíreas daonna
Tdap	Teiteanas, dáilleog íseal diftéire agus triuch éigeallach
MenACWY	Cineálacha meiningeacocúla A, C, W agus Y
Fliú	Influenza

Príomh-íomhíonadh Óige

Ainm na vacsaíne Aois a thugtar é Déantúsóir Cnuasúimhir

Cuairt DG 1 | 2 mhí

6 in 1			
PCV			
MenB			
Rótai			

Cuairt DG 2 | 4 mhí

Dáta an Chéad Choinne Eile:

6 in 1			
MenB			
Rótai			

Cuairt DG 3 | 6 mhí

Dáta an Chéad Choinne Eile:

6 in 1			
PCV			

6 in 1 Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitíteas B, Triuch, Póilió, Teiteanas

Ainm

Dáta breithe

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

[Purple Header Bar]			
Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta

PCV Comhchuingeach níumacocúil

MenB Ionfhabhtú Meiningeacocúil B

Rótaí Rótaivíreas

Príomh-íomhíonadh Óige

Ainm na vacsaíne Aois a thugtar é Déantúsóir Cnuasuimhir

Cuairt DG 4 | 12 mhí

Dáta an Chéad Choinne Eile:

MMR			
MenB			
Deilgneach			

Cuairt DG 5 | 13 mhí

Dáta an Chéad Choinne Eile:

6 in 1			
MenC			
PCV			

Eile

MMR Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg

MenB Ionfhabhtú Meiningeacocúil B

PCV Comhchuingeach níúmacocúil

Ainm

Dáta breithe

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta







Deilgneach Varicella

6 in 1

Diftéire, Haemophilus influenzae b (Hib), Heipitíteas B,
Triuch, Póilió, Teiteanas

Príomh-íomhíonadh Óige

Ainm na vacsaíne Aois a thugtar é Déantúsóir Cruasuimhir

Vacsaíní Séasúracha

Ainm

Dáta breithe

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta

Imdhíontáí Scoile

Ainm na vacsaíne

Aois a thugtar é

Déantúsóir

Cnuasúimhir

Bunscoil

4 in 1			
MMRV			

Meánscoil

Tdap			
MenACWY			
HPV			

Eile

4 in 1 Diftéire, Triuch, Póilió, Teiteanas

MMRV Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg agus Deilgneach (Varicella)

MMR Bruitíneach, Leicneach, Bruitíneach Dhearg

Tdap Teiteanas, dáileog íseal diftéire agus triuch éigeallach

Ainm

Dáta breithe

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta



Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta



Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta



Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta

MenACWY Cineálacha meiningeacocúla A, C, W agus Y
HPV Papalómaivíreas daonna

Ainm

Dáta breithe

Dáta Éaga

Bealach/Suíomh

Tugtha ag

Dáta

Dáta Éaga	Bealach/Suíomh	Tugtha ag	Dáta

Comhairle iar-vacsáinthe

Céard iad na frithghníomhartha coitianta a d'fhéadfadh teacht ar mo leanbh tar éis dó/di a bheith vacsáinthe agus céard ba chóir dom a dhéanamh?

Frithghníomh coitianta	Cad ba chóir a dhéanamh
Bíonn fiabhras coitianta i measc leanaí tar éis dóibh an vacsaín MenB ag 2 mhí agus 4 mhí d'aois a fháil (Cuartir 1 agus 2). Níor cheart duit paraicéiteamól a thabhairt do do leanbh ach tar éis na cuairte 2 mhí agus na cuairte 4 mhí	Tabhair paraicéiteamól leachtach naíonáin <ol style="list-style-type: none">1. Tabhair 2.5 ml (60 mg) tráth a thugtar an vacsaín nó go gairid ina dhiaidh sin.2. Tabhair an dara dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis na chéad dáileoige.3. Tabhair an tríú dáileog de 2.5 ml (60 mg) idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an dara dáileoige.4. Tabhair an ceathrú dáileog idir 4 agus 6 uair an chloig tar éis an tríú dáileog má tá fiabhras fós ar do leanbh.
Tinneas, at* agus deargadh in áit an insteallta	<ul style="list-style-type: none">• Tabhair paraicéiteamól chun tinneas agus pianta a mhaolú.• Déan deimhin de nach bhfuil éadaí an linbh róchúng nó ag luí ar an áit a fuair an leanbh an t-instealladh.
Buinneach éadrom tar éis na vacsaíne rótaivíris	<ul style="list-style-type: none">• Tabhair breis bainne le hól• Nigh do lámha go cúramach tar éis clúidín do linbh a athrú agus a chur sa bhosca bruscair.

Frithghníomh coitianta	Cad ba chóir a dhéanamh
Fiabhras (os cionn 39°C)	<ul style="list-style-type: none"> • Ná cuir an iomarca éadaí ar an leanbh • Bí cinnte de nach bhfuil a seomra róthe • Tabhair sreabháin bhreise le n-ól • Tabhair paraicéiteamól chun an fiabhrais a íslíú
Tinneas cinn nó greannaitheacht	<ul style="list-style-type: none"> • Tabhair paraicéiteamól chun tinneas agus pianta a mhaolú.

* I gcás páistí scoile, d'fhéadfaí go mbeadh an t-at le feiceáil ón ngualainn go dtí an uillinn.

Is gnách go dtarlaíonn sé seo taobh istigh de dhá lá tar éis na vacsaíne agus éiríonn sé níos fearr tar éis 4 – 5 lá. Níl gá le hantaibheathaigh chun an frithghníomhú logánta seo a chóireáil.

- Tá an dáileog de pharaicéiteamól a mholtar do do leanbh scríofa ar an mbuidéal de réir aois an linbh.
- Iarr ar do phoitigéir meascán paraicéiteamóil gan siúcra atá oiriúnach d'aois do linbh a thabhairt duit.
- D'fhéadfadh paraicéiteamól a úsáid thar thréimhse fhada, gan chomhairle a fháil ó dhochtúir, dochar a dhéanamh.

Le haghaidh a thuilleadh eolais

Léigh le do thoil an leabhrán 'Imdhíonadh do Linbh – Treoir do Thuismitheoirí.'

Tabhair cuairt ar shuíomh gréasáin imdhíonta FSS ag **www.immunisation.ie**

Má tá tú buartha faoi do leanbh, déan teagmháil le do dhochtúir ginearálta, le haltra i gclinic do Dhochtúra Ghinearálta nó altra sláinte poiblí chun tuilleadh comhairle a fháil, le do thoil.



Arna fhoilsiú ag: Oifig Náisiúnta Imdhíonta FSS

Dáta foilsithe: Bealtaine 2023

Athbhreithnithe i mí Iúil 2024

Cód ordaithe: HNI01686