



کالی کھانسی کی ویکسین کے ذریعے اپنے بچے کو محفوظ رکھیں

یہ کیسے پہلیتی ہے؟

کھانسے، چھینکنے یا قربی رابطے کے ذریعے ایک شخص سے دوسرا میں کالی کھانسی منتقل ہو جاتی ہے۔ کالی کھانسی میں مبتلا شخص کھانسی شروع ہونے کے 3 ہفتے بعد تک انفیکشن پھیلا سکتا ہے۔ کالی کھانسی میں مبتلا اکثر بچے فیملی کے ایسے افراد سے رابطہ میں آئے ہوئے ہیں جن کی کھانسی 2 ہفتتوں سے زائد وقت تک جاری رہی تھی۔



اس کی روک تھام کیسے کی جا سکتی ہے؟

کالی کھانسی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ ویکسین لگوانا ہے۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ کے حمل کے 16–36 ہفتتوں کے درمیان آپ کا جی پی آپ کو بلا معاوضہ کالی کھانسی کی ویکسین دی سکتا ہے۔ اگر آپ حال بی میں کسی اور ملک سے آئرلینڈ آئی ہیں تو آپ کو اپنے بچے کے تحفظ میں مدد کے لئے حمل کے دوران کالی کھانسی کی ویکسین لگوانی چاہیے۔

کیا ویکسین لگوانے سے مجھے کالی کھانسی ہو سکتی ہے؟

نہیں۔ ویکسین سے آپ کو کالی کھانسی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس میں کوئی زندہ بیکٹیریا شامل نہیں ہوتا۔

حمل کے دوران ویکسین لگوانے سے میرے بچے کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟

ویکسین کی وجہ سے آپ کا مدافعتی نظام کالی کھانسی کے بیکٹیریا کے خلاف بڑی مقدار میں اینٹی باڈیز پیدا کرتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز آپ کے رحم میں موجود بچے میں بھی منتقل ہو جاتی ہیں اور اس کی زندگی کے ابتدائی مہینوں میں اس کی حفاظت کرتی ہیں۔

اب معلوم ہو چکا ہے کہ جن بچوں کی ماہیں حمل کے دوران کالی کھانسی کی ویکسین لگواتی ہیں، انہیں زندگی کے ابتدائی مہینوں میں کالی کھانسی ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔

مجھے بچنے میں کالی کھانسی کی ویکسین لگائی گئی تھی، کیا مجھے دوبارہ ویکسین لگوانے کی ضرورت ہے؟

جی ہاں۔ حمل کے دوران ویکسین لگوانا یہ حد ابھم ہے۔ جو ویکسین آپ حمل کے دوران لگواتی ہیں، اس کا مقصد آپ کے بچے کی حفاظت ہے۔

حمل کے دوران کالی کھانسی کی ویکسین لگوانے سے آپ کا بچہ محفوظ رہے گا۔

آپ کی جی پی پریکٹس پر یہ ویکسین بلا معاوضہ دستیاب ہے۔

ویکسین لگوانے کا بہترین وقت حمل کے 16 سے 36 ہفتتوں کے درمیان ہے۔

حمل کے دوران کالی کھانسی کی ویکسین لگوا کر آپ یقینی بنا سکتی ہیں کہ آپ کا بچہ پیدائش کے لمحے سے ہی محفوظ رہے۔ اپائٹنمنٹ لینے کے لئے اپنے جی پی سے رابطہ کریں۔

* آپ کی جی پی پریکٹس پر یہ ویکسین بلا معاوضہ دستیاب ہے۔ تاہم اگر آپ کے جی پی کا کلینک پوری طرح نہیں ہے تو وہ ویکسین لگوانے کے وزٹ کے لئے آپ سے فیس لے سکتے ہیں۔

کالی کھانسی (پریسز) کیا ہے؟

کالی کھانسی (یا پریسز) ایک تیزی سے پھیلنے والا انفیکشن ہے جو جان لیوا ہو سکتا ہے۔

یہ انفیکشن 6 ماہ سے کم عمر بچوں کے لئے سنگین ترین ہوتا ہے۔ کالی کھانسی سے متاثرہ کئی بچوں کو نمونیہ اور دماغی چوٹ جیسی پیچیدگیوں کے ساتھ ہسپیتال لایا جاتا ہے۔

6 ماہ سے کم عمر بچوں کو کم عمری کی وجہ سے پوری طرح ویکسین نہیں دی جا سکتی۔ اسی لئے یہ ابم ہے کہ پیشگی تیاری کی جائے اور حمل کے دوران ویکسین لگوالی جائے۔

علامات کیا ہیں؟

کالی کھانسی بچوں میں دیر تک رینے والی کھانسی اور گلا بند پہونچ کے مسائل پیدا کرنے ہے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔

مسلسل کھانسی کے دوران سانس لینے کی کوشش یہ 'خرخر' کی آواز آتی ہے۔ کالی کھانسی میں مبتلا بچہ کھانسی آنے کے بعد سانس بند ہونے یا ق آنے کے باعث نیلا پڑ سکتا ہے۔

سب بچے 'خرخر' کی آواز نہیں نکالتے اور اکثر بڑے بچے اور بالغ افراد صرف کھانستے ہیں۔

کھانسی 3 ماہ تک جاری رہ سکتی ہے۔ اگر آپ کے بچے کو کالی کھانسی ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوبارہ یہ مرض نہیں ہو سکتا۔

آپ اس کتابچے کے صفحہ 10 میں اپنے بچے کو ویکسین لگوانے کے بارے میں پڑھ سکتی ہیں۔



مجھے ویکسین کب لگوانی چاہیے؟

آپ حمل کے 16-36 ہفتون کے درمیان کالی کھانسی کی ویکسین سکھی ہیں۔

بعد میں ویکسین لگوانے کی کوئی خاص معقول وجہ نہیں ہے۔ اگر آپ کی طبیعت تھیک نہ ہو اور درجہ حرارت 38°C سے زائد پہنچو آپ کی ویکسینیشن کو بعد میں شیدول کیا جا سکتا ہے۔

حمل میں دی جانے والی کالی کھانسی کی ویکسین کا نام کیا ہے؟ کالی کھانسی سے تحفظ کے لئے حمل میں دی جانے والی ویکسین Tdap ہے۔

یہ کم مقدار والی بوسٹر ویکسین ہے جو درج ذیل سے تحفظ فراہم کرتی ہے:

- ✓ نیٹنس (T)
- ✓ ڈفھیریا (d)
- ✓ اے سیلوولر پریسٹر (ap) (کالی کھانسی)

کیا مجھے ہر حمل کے دوران ویکسین لگوانے کی ضرورت ہے؟ جی ہاں۔ ویکسینیشن کے بعد آپ میں پیدا ہوئے والی اینٹی باڈیز کی مقدار وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر حمل کے دوران ویکسین لگوانے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ اینٹی باڈیز بنا سکتی گی جو آپ کے رحم میں موجود بھے میں منتقل ہو جائیں گی۔

اس کے بعد مجھے کیا توقع رکھئی چاہیے؟

آپ کو انجیکشن کے مقام پر سرخی نظر آسکتی ہے یا درد ہو سکتا ہے۔ شاید آپ 48 گھنٹوں تک پلا پہلکا عمومی رعد عمل محسوس کریں، جیسا کہ بخار اور تھکاوت۔

طبیعت خراب ہوئے پر مجھے کیا کرنا چاہیے؟

اگر ویکسین لگوانے کے بعد آپ کا درجہ حرارت زیادہ ہو تو آپ پیراسیڈامول لے سکتی ہیں۔ حمل کے دوران ویکسینیشن کے بعد زیادہ درجہ حرارت کے علاج کے لئے آئیبیوپروفن یا ایسپرین نہ لیں۔

یاد رکھیں، اگر ویکسین لگوانے کے بعد آپ کی طبیعت خراب ہوئی ہے تو اس کی کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ فرض نہ کریں کہ ایسا ویکسین کی وجہ سے ہے۔ ضرورت ہوئے پر اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔

ضممنی اثرات کی اطلاع دینا

اگر آپ کے خیال میں ویکسین لگوانے کے بعد آپ پر کوئی ضممنی اثر ہوا ہے تو تمام ویکسینز کی طرح آپ صحت کی مصنوعات کی ضابطہ کاری اتھارٹی (HPRA) کو www.hpra.ie پر اس کی اطلاع دے سکتی ہیں۔

آپ کا ڈاکٹر، نرس، فارماسیٹ یا فیملی کا کوئی فرد بھی HPRA کو ضممنی اثر کی اطلاع دے سکتا ہے۔

کیا حاملہ خواتین کے لئے ویکسین لگوانا محفوظ عمل ہے؟

جی ہاں۔ حمل کے دوران ویکسین لگوانا محفوظ عمل ہے۔ آئرلینڈ اور دیگر ممالک، جیسا کہ یوکے، امریکہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں حاملہ خواتین کے لئے کالی کھانسی کی ویکسین کی تجویز دی جاتی ہے۔

حاملہ خواتین میں اس کالی کھانسی کی ویکسین کا مطالعہ کیا گیا ہے اور کوئی خطرہ نہیں پایا گی۔ عام طور پر پلا پہلکا رعد عمل ہوتا ہے اور سنگین ضممنی اثرات نہایت نایاب ہیں۔



کیا کوئی ایسے لوگ ہیں جنہیں کالی کھانسی کی ویکسین نہیں لگوانی چاہیے؟

درج ذیل صورتوں میں آپ کو ویکسین نہیں لگوانی چاہیے:

- آپ کو ماضی میں کالی کھانسی کی ویکسین یا ویکسین کے کسی حصہ کی سابقہ خوارک سے شدید الرجک رعد عمل (اینافلیکسز) ہو چکا ہے۔

سابقہ خوارک کے بعد آپ کا بازو سوجا ہوا تھا اور اس میں درد تھا۔ (یہ بالکل عام نہیں ہے)۔ اگر ویکسین کے مقام پر آپ کو شدید رعد عمل ہوا تھا تو آپ کو 10 سال میں ایک مرتبہ ہے زیادہ ویکسین نہیں لگوانی چاہیے۔

میرا بچہ قبل از وقت پیدا ہوا تھا؛ اگر میں نے ویکسین لگوانے پہنچا کیا کھانسی سے محفوظ رہے گا؟

ممکن ہے کہ 32 ہفتون سے پہلے پیدا ہوئے والے بچے رحم میں موجودگی کے دوران آپ سے کافی اینٹی باڈیز حاصل نہ کر سکتے۔ تاپم ویکسین آپ کے بچے کو آپ سے کالی کھانسی لگنے کا خطرہ کم کر دے گی۔

آپ درج ذیل کاموں کے ذریعہ بھی اپنے قبل از وقت پیدا ہوئے والے بچے کو کالی کھانسی سے محفوظ رکھہ سکتی ہیں:

- یقینی بنانا کہ گھر کے دیگر بچے تمام ویکسینز لگوانے کے پہنچا کے گھر کے تمام بالغ افراد تمام ویکسینز لگوانے کے پہنچا۔

اگر فیملی میں کسی نے گذشتہ 10 سالوں میں کالی کھانسی کی ویکسین نہیں لگوانی تو انہیں بچے سے رابطہ میں آنے سے 2 ہفتے پہلے یہ ویکسین لگوانی چاہیے۔

میں نے حمل کے دوران ویکسینیشن کروائی تھی؛ کیا میرے بچے کو ابھی بھی کالی کھانسی کی ویکسین کی ضرورت ہے؟

جی ہاں۔ رحم میں آپ سے آپ کے بچے میں منتقل ہوئے والے اینٹی باڈیز اس کی زندگی کے پہلے چھ ماہ کے دوران تیزی سے گھٹ جاتی ہیں۔

لہذا یہ ایم ہے کہ آپ کا بچہ وقت پر معمول کی بچپن کی ویکسینز لگوانے (جن میں کالی کھانسی کی ویکسین شامل ہے) تمام بچوں کو بلا معاوضہ کالی کھانسی کی ویکسین پیش کی جاتی ہے:

- 2، 4، 6 اور 13 ماہ کی عمر میں 1 میں 6 ویکسین کے حصہ کے طور پر

• 5-4 سال کی عمر میں (1 میں 4 ویکسین)

• سیکنڈ لیول اسکول کے پہلے سال میں (Tdap ویکسین)

جب آپ کا بچہ وقت پر یہ ویکسینز لگوانا ہے تو وہ کالی کھانسی سے محفوظ رہتا ہے۔

آپ کا immunisation.ie اور mychild.ie پر کالی کھانسی کی ویکسین کے متعلق مزید بڑھ سکتی ہیں۔

میں ویکسین کیسے لگوانوں؟

اپاٹنٹمنٹ لینے کے لئے اپنے جی پی سے رابطہ کریں۔

اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ کا جی پی آپ کو بلا معاوضہ کالی کھانسی کی ویکسین دے سکتا ہے۔

تاپم اگر آپ کے جی پی کا کلینک پوری طرح نجی ہے تو وہ ویکسین لگوانے کے وزٹ کے لئے آپ سے فیس لے سکتے ہیں۔ شائع کردہ از: HSE قومی مامونیت کا دفتر

اشاعت کی تاریخ: مارچ 2025